



ONKOLOŠKI INŠTITUT  
INSTITUTE OF ONCOLOGY  
LJUBLJANA

# OLAPARIB ZA ZDRAVLJENJE RAKA JAJČNIKOV

Tretja izdaja



## KAZALO

1. Zakaj mi je zdravnik predpisal olaparib? .....	4
2. Kaj je olaparib in kako deluje? .....	5
3. Kaj pomeni mutacija gena BRCA? .....	5
4. Kaj je HRD? .....	6
5. Kaj moram vedeti, preden vzamem olaparib? .....	7
6. Kako naj jemljem olaparib?.....	11
7. Kateri so najpogostejši neželeni učinki olapariba? .....	14
8. Kako naj shranjujem olaparib?.....	16
Bolnikov dnevnik .....	17
Pomembni podatki .....	18

### **OLAPARIB ZA ZDRAVLJENJE RAKA JAJČNIKOV**

Tretja izdaja

#### **Avtorji:**

doc. dr. Erik Škof, dr. med.,

dr. Breda Škrbinc, dr.med.,

Brigita Gregorič, dr.med.

**Oblikovanje:** Barbara Bogataj Kokalj, Studio Aleja d.o.o.

**Ilustracije:** Dollarphotoclub

**Izdal:** Onkološki inštitut Ljubljana

**Tisk:** Tiskarna Koštomaj d.o.o., Celje

**Izdajo omogočila:** AstraZeneca UK Limited, podružnica v Sloveniji,

Verovškova 55, Ljubljana

**Naklada:** 300 izvodov

**Leto izida:** 2023

INT/2023/6

Knjižice za bolnike so dosegljive tudi v digitalni obliki na spletnih straneh  
[www.onko-i.si/za-javnost-in-bolnike/publikacije](http://www.onko-i.si/za-javnost-in-bolnike/publikacije)

## INFORMACIJE O ZDRAVLJENJU Z OLAPARIBOM

Knjižica, ki je pred vami, je namenjena vam, ker vam je zdravnik predpisal zdravilo olaparib.

Prosimo, da pred začetkom jemanja olapariba natančno preberete to **knjižico** in **navodilo za uporabo zdravila**, ki je priloženo zdravilu v škatli, saj vsebujeta za vas pomembne podatke. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom.

V tej knjižici najdete informacije in odgovore na naslednja vprašanja:

1. Zakaj mi je zdravnik predpisal olaparib?
2. Kaj je olaparib in kako deluje?
3. Kaj pomeni mutacija gena *BRCA*?
4. Kaj je HRD?
5. Kaj moram vedeti, preden vzamem olaparib?
6. Kako naj jemljem olaparib?
7. Kateri so najpogostejši neželeni učinki olapariba?
8. Kako naj shranjujem olaparib?

# 1. ZAKAJ MI JE ZDRAVNIK PREDPISAL OLAPARIB?

Olaparib vam je zdravnik predpisal za zdravljenje raka jajčnikov za eno izmed možnosti:

**rak jajčnikov z mutacijo gena *BRCA*, ki se je odzval na prvo zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine.**

Za ugotavljanje tega, ali imate raka jajčnikov z mutacijo gena *BRCA*, se uporablja posebna genetska preiskava iz vzorca tumorja ali iz vzorca krvi. Izraz *BRCA* je kratica, ki v slovenskem prevodu pomeni »gen dovzetnosti za pojav raka dojk«. Zdravilo olaparib se uporablja samostojno.

**rak jajčnikov z okvaro homologne rekombinacije (HRD-pozitiven rak) kot posledica mutacije gena *BRCA* ali genomske nestabilnosti, ki se je odzval na prvo zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine in bevacizumabom.**

Za ugotavljanje HRD-pozitivnega raka jajčnikov se uporablja posebna genetska preiskava. Zdravilo olaparib se lahko uporablja samostojno ali skupaj z bevacizumabom.

**rak jajčnikov, ki se je ponovil.** Zdravilo olaparib se lahko uporabi potem, ko se je rak odzval na predhodno zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine. Zdravilo olaparib se uporablja samostojno.

Zdravilo olaparib je odobreno tudi za zdravljenje drugih vrst rakov, ki so posledica mutacije v genu *BRCA* (rak dojke, rak trebušne slinavke, rak prostate)

Če zdravilo olaparib prejimate v kombinaciji z drugimi zdravili proti raku, je pomembno, da preberete tudi navodila za uporabo teh drugih zdravil. Če imate o teh zdravilih kakršna koli vprašanja, se posvetujte z zdravnikom.


## 2. KAJ JE OLAPARIB IN KAKO DELUJE?

Olaparib je zdravilo, ki je v obliki tablet. Uvrščamo ga v skupino zdravil za zdravljenje raka, ki jo imenujemo zaviralci PARP (poli [adenozin-difosfat-riboza] polimeraza). PARP so encimi, ki so prisotni v našem telesu in sodelujejo pri popravljanju napak na DNK - nosilki našega dednega zapisa (genov). Pri bolnicah z mutacijami dveh posebnih genov, imenovanih gen *BRCA 1* ali gen *BRCA 2*, ali pri bolnicah z genomsko nestabilnostjo (določeno s HRD), lahko zaviralci PARP (torej olaparib) povzročijo odmrtnje rakavih celic tako, da preprečijo delovanje encimov, ki so udeleženi pri popravljanju napak na DNK. Olaparib deluje le na rakave celice, medtem ko na naše zdrave (ne-rakave) celice nima takšnega vpliva.

## 3. KAJ JE MUTACIJA GENA BRCA?

V genih so zapisane vse naše lastnosti, ki jih podedujemo od staršev. V vsaki celici imamo dve kopiji istega gena. Za normalno rast in delovanje celic je nujno potrebno usklajeno delovanje vseh genov v našem telesu. Naše celice se nenehno delijo in obnavljajo (stare celice odmrjejo, nadomestijo jih nove). Včasih pride pri tem do napak. V našem telesu imamo popravljalne mehanizme, ki te napake sproti popravljajo. Ko napak ni možno popraviti, celice praviloma odmrjejo in jih nadomestijo nove, zdrave celice. Do nastanka raka lahko pride, ko napaka določenega gena namesto celične smrti povzroči nenadzorovano rast in razmnoževanje celic. V takšnem primeru uporabljamo izraz mutacija gena - gre za škodljivo spremembo gena. Do takšnih sprememb v genih lahko pride kadarkoli v času našega življenja. Mutacija gena je lahko prisotna le v tumorskih celicah - v tem primeru gre za somatsko mutacijo, ki ni dedna. Kadar pa je mutacija gena prisotna v vseh celicah telesa pa gre za dedno genetsko mutacijo. Primer dedne genetske mutacije je mutacija v genih *BRCA 1* ali *BRCA 2*.

*BRCA 1* in *BRCA 2* sta gena, ki pomagata pri popravljanju in odpravljanju poškodb, ki nastanejo v naših celicah v DNK. Ko gena *BRCA 1* ali *BRCA 2* ne delujeta normalno, obstaja večja verjetnost,



da se poškodbe v naših celicah ne popravljajo pravilno, kar lahko vodi do razvoja raka. Nekatere spremembe teh genov so neškodljive, nekatere pa lahko pomenijo veliko tveganje za pojav določenih oblik raka (na primer raka dojke in raka jajčnikov pri ženskah ter raka dojke in raka prostate pri moških) – v tem primeru govorimo o mutacijah v genih *BRCA 1* ali *BRCA 2*.

Mutacija v genih *BRCA 1* ali *BRCA 2* je lahko posledica dedne genske mutacije, ki se lahko prenaša na vaše potomce, zato smo vam v času zdravljenja že predlagali posvet v naši *Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje*, ki jo imamo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

## 4. KAJ JE HRD-POZITIVEN RAK?

Izraz HRD je kratica, ki pomeni, da gre v tumorju za okvaro homologne rekombinacije (angl. homologous recombination deficiency). Homologna rekombinacija je pomemben popravljalni mehanizem napak v DNK. Le-ta je odvisen od delovanja genov *BRCA*, poleg tega pa tudi od drugih dejavnikov (npr. mutacija genov *RAD51*, *BRIP*, metilacija določenih genov, itd).

Za ugotavljanje HRD-pozitivnega raka jajčnikov se uporablja posebna genetska preiskava.

Kadar gre za HRD-pozitiven rak gre za genomsko nestabilnost, ki običajno pomeni dober učinek zdravljenja z zaviralci PARP (torej olaparibom) pri bolnicah z napredujočim rakom jajčnikov, ki se je odzval na prvo zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine.

Zdravljenje z olaparibom v primeru HRD- pozitivnega raka poteka:

- kot samostojno zdravljenje, če je HRD posledica mutacije v genih *BRCA*,
- v kombinaciji z bevacizumabom, če HRD ni posledica mutacije v genih *BRCA*, ampak so vzrok za HRD drugi dejavniki.

## 5. KAJ MORAM VEDETI, PREDEN VZAMEM OLAPARIB?

### Komu je namenjen olaparib?

Zdravilo olaparib je namenjeno zdravljenju bolnic z napredovalim rakom jajčnikov v primeru ugotovljene mutacije v genih *BRCA*, ki so pred tem bile zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine.

Namenjeno je tudi vrsti raka jajčnikov v primeru ugotovljenega HRD-pozitivnega stanja, opredeljenega z mutacijo gena *BRCA* ali genomsko nestabilnostjo), ki so se odzvale na prvo zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine in bevacizumabom. Zdravilo olaparib se uporablja skupaj z bevacizumabom.

Prav tako je namenjeno zdravljenju ponovitve raka jajčnikov. Uporabi se lahko potem, ko se je rak odzval na predhodno zdravljenje s standardno kemoterapijo na osnovi platine.

### Kdaj olapariba ne smem jemati?

Pred začetkom zdravljenja ali med zdravljenjem z olaparibom se posvetujte z zdravnikom:

- če ste alergični na olaparib ali katero koli sestavino v kapsulah,
- če ste noseči ali dojite.

### Kdaj je potrebna posebna previdnost pri uporabi olapariba?

Pred začetkom zdravljenja ali med zdravljenjem z olaparibom se posvetujte z zdravnikom:

- če imate pri preiskavi krvi majhno število krvnih celic. Lahko imate majhno število rdečih krvnih celic (anemijo), majhno število belih krvnih celic (nevtropenijo) ali majhno število krvnih ploščic (trombocitopenijo);

- če imate vročino ali okužbo, podplutbe ali krvavitev. Redko je to lahko znak resnejše težave s kostnim mozgom;
- če se vam na novo pojavijo ali se vam poslabšajo kratka sapa, kašelj ali piskajoče dihanje;
- če se vam na novo pojavijo ali se vam poslabšajo naslednji simptomi: bolečina ali oteklina v okončini, kratka sapa, bolečine v prsih, hitrejše dihanje kot po navadi ali hitrejši srčni utrip kot po navadi.

### **Ali lahko med jemanjem olapariba jemljem tudi druga zdravila?**

Obvestite zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. To velja tudi za zdravila, ki ste jih dobili brez recepta in za zdravila rastlinskega izvora. Olaparib namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil in tudi nekatera druga zdravila lahko vplivajo na njegovo delovanje.

Zdravniku morate povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- katero koli drugo zdravilo proti raku;
- kakšno cepivo ali zdravilo, ki zavira imunski sistem, ker boste morda potrebovali skrbno spremljanje;
- itrakonazol, flukonazol - uporabljata se za glivične okužbe;
- telitromicin, klaritromicin, eritromicin - uporabljajo se za bakterijske okužbe;
- okrepljene zaviralce proteaz, boceprevir, telaprevir, nevirapin, efavirenz – uporabljajo se za virusne okužbe, vključno s HIV;
- rifampicin, rifapentin, rifabutin – uporabljajo se za bakterijske okužbe, vključno s tuberkulozo;
- fenitoin, karbamazepin, fenobarbital – uporabljajo se kot pomirjevala ali za zdravljenje napadov krčev (epileptičnih napadov) in epilepsije;



- šentjanževka (*Hypericum perforatum*) – zdravilo rastlinskega izvora, ki se v glavnem uporablja pri depresiji.
- digoksin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan - uporabljajo se za zdravljenje bolezni srca ali hipertenzije;
- bosentan - uporablja se za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije;
- simvastatin, pravastatin, rosuvastatin - uporabljajo se za zmanjševanje koncentracije holesterola v krvi;
- dabigatran - uporablja se za redčenje krvi;
- glibenklamid, metformin, repaglinid - uporablja se za zdravljenje sladkorne bolezni;
- ergot alkaloidi - uporablja se za zdravljenje migren in glavobolov;
- fentanil - uporablja se za zdravljenje bolečin raka;
- pimizid, kvetiapin - uporabljata se za zdravljenje težav z duševnim zdravjem;
- cisaprid - uporablja se za zdravljenje težav z želodcem;
- kolhicin - uporablja se za zdravljenje protina;
- ciklosporin, sirolimus, takrolimus - uporablja se za zaviranje imunskega sistema;
- metotreksat - uporablja se za zdravljenje raka, revmatoidnega artritisa in luskavice.



### **Ali lahko jemljem olaparib, če sem noseča?**

Ne jemljite olapariba, če ste noseči ali če bi lahko zanosili. Škoduje namreč lahko nerojenemu otroku.

Med jemanjem tega zdravila ne smete zanositi, zato med jemanjem olapariba in še en mesec po prejetju zadnjega odmerka olapariba uporabljajte učinkovito kontracepcijo. Zdravnika morate obvestiti, če jemljete kontracepcijske tablete. Zdravnik vam bo morda svetoval dodatno uporabo še kakšnega nehormonskega načina kontracepcije. Če med tem časom zanosite, se morate nemudoma posvetovati z zdravnikom.

### **Ali lahko jemljem olaparib, če dojim?**

Ni znano, ali olaparib prehaja v materino mleko, zato med jemanjem zdravila in še en mesec po prejetju zadnjega odmerka ne smete dojiti. Če nameravate dojiti, morate to povedati zdravniku.

### **Ali lahko med jemanjem olapariba upravljam vozila in/ali stroje?**

Olaparib lahko vpliva na vašo sposobnost upravljanja vozil in strojev. Ne upravljajte vozil ali strojev, če ste med jemanjem zdravila omotični, šibki ali utrujeni.

## 6. KAKO NAJ JEMLJEM OLAPARIB?

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli od zdravnika. Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se z njim posvetujte.

### Koliko zdravila naj vzamem?

Olaparib je na voljo v 100-mg in 150-mg tabletah.

Običajni priporočeni odmerek je 300 mg (dve 150-mg tableti) dvakrat na dan – skupaj 4 tablete vsak dan.

Tablete olaparib morate pogoltniti cele, s hrano ali brez nje.

Olaparib vzemite enkrat zjutraj in enkrat zvečer.

Tablet ne grizite, ne drobite, ne raztapljajte in ne lomite, ker lahko vse naštetu vpliva na to, kako hitro zdravilo pride v telo.

Zdravnik vam bo povedal, koliko tablet olaparib morate vzeti. Pomembno je, da vsak dan vzamete celotni priporočeni odmerek.



### Kako naj jemljem zdravilo?

Običajni odmerek olapariba je 4 tablete na dan, ki jih zaužijete z vodo, v dveh dnevni odmerkih: en odmerek 2 tableti olapariba zaužijete zjutraj in en odmerek 2 tableti zaužijete zvečer. Zdravilo morate vzeti vsak dan ob približno istem času, tako da je med odmerkoma približno 12 ur razlike.

Med jemanjem zdravila olaparib ne pijte grenivkega soka. Grenivkin sok namreč lahko vpliva na delovanje zdravila.

### Kaj naj naredim, če vzamem večji odmerek zdravila?

Če vzamete odmerek olapariba, ki je večji od vašega predpisanega odmerka, se takoj posvetujte z zdravnikom.





**BUJENJE**

## JUTRANJI ODMEREK



Tablete zdravila olaparib morate pogoltniti cele s kozarcem vode. Tablete olaparib lahko jemljete s hrano ali brez nje.



**12-URNO OBDOBJE**

## VEČERNI ODMEREK



**ZAJTRK**



**VEČERJA**

00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
**08**  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
**20**  
21  
22  
23  
24

## **Kaj naj naredim, če pozabim vzeti zdravilo?**

Če ste pozabili vzeti olaparib, vzemite naslednji odmerek ob predvidenem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

## **Kako dolgo naj jemljem zdravilo?**

Trajanje zdravljenja je odvisno od vaše bolezni in od odziva na zdravilo.

Zdravljenje traja v prvi liniji vzdrževalnega zdravljenja napredovanega raka jajčnikov do največ 2 leti, če po 2 letih zdravljenja ni radioloških znakov bolezni. Bolniki, ki imajo po 2 letih znake bolezni in bi jim zdravljenje po mnenju zdravnika koristilo, lahko zdravljenje nadaljujejo več kot 2 leti.

Vzdrževalno zdravljenje ponovitve raka jajčnikov traja dokler gre za ugoden učinek zdravljenja - do napredovanja osnovne bolezni ali do pojava resnih neželenih učinkov zdravljenja.

## 7. KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI NEŽELENI UČINKI OLAPARIBA?

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Pomembno je, da veste, kakšni so lahko neželeni učinki.

Med jemanjem olapariba se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:

- zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov): glavobol, omotica, izguba teka, občutek utrujenosti ali šibkosti, občutek slabosti s siljenjem na bruhanje (navzea), bruhanje, spremenjeno okušanje hrane, težave z želodcem ali zgaga (dispepsija), driska (če postane huda, morate to nemudoma povedati zdravniku), kašelj, kratka sapa (dispneja), majhno število belih krvnih celic v krvi (zaradi česar se lahko zmanjša vaša sposobnost za premagovanje okužb in je lahko povezano z vročino);
- pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov): vnetje v ustih (stomatitis), izpuščaj, bolečine v predelu želodca pod rebri (v zgornjem delu trebuha), krvni strdek v eni od globokih ven, po navadi v nogi (venska tromboza), ki lahko povzroči simptome, kot so bolečina in otekllost noge, ali strdek v pljučih (pljučna embolija), ki lahko povzroči simptome, kot so kratka sapa, bolečine v prsih, hitrejša dihanje kot ponavadi ali hitrejši srčni utrip kot ponavadi. Na preiskavah krvi se lahko pokaže majhno število belih krvnih celic (zaradi česar se lahko zmanjša sposobnost za premagovanje okužb in je lahko povezano z vročino), zmanjšano število trombocitov v krvi (opazite lahko podplutbe ali krvavitve, ki trajajo dlje kot ponavadi) ter zvišanje kreatinina v krvi (preiskava pokaže za preverjanje delovanje ledvic).



## Kdaj moram nemudoma obvestiti zdravnika?

Če opazite katerega od spodaj naštetih neželenih učinkov, **nemudoma** obvestite zdravnika. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč:

- kratka sapa, občutek hude utrujenosti, bledica kože ali hitro bitje srca – to so lahko znaki majhnega števila rdečih krvnih celic (anemije);
- alergijske reakcije (npr. koprivnica, težko dihanje ali požiranje, omotica, ki so znaki in simptomi preobčutljivostnih reakcij);
- srbeč izpuščaj ali otekla pordela koža (dermatitis);
- resne težave s kostnim mozgom (mielodisplastični sindrom ali akutna mieloična levkemija).

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom. Z njim se posvetujte tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tej knjižici. Zdravnik vam lahko predpiše tudi druga zdravila za pomoč pri obvladovanju neželenih učinkov.

## Kako zdravimo neželene učinke?

Zdravnik vam lahko predpiše zdravila za zdravljenje simptomov, kot so slabost v želodcu, bruhanje, driska ali dispepsija. Brez obvestila ali posveta z zdravnikom ne jemljite drugih zdravil.

## Znižanje odmerka zdravila?

Če se pojavijo neželeni učinki zdravila, vam lahko zdravnik zniža odmere olapariba.

## Ali lahko po krajši prekinitvi ponovno nadaljujem zdravljenje?

Zdravnik vam bo povedal, ali je varno nadaljevati zdravljenje.

## Kako in komu poročam o neželenih učinkih?

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tej knjižici. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
Sektor za farmakovigilanco  
Nacionalni center za farmakovigilanco  
Slovenčeva ulica 22  
SI-1000 Ljubljana  
Tel: +386(0)8 2000 500  
Faks: +386(0)8 2000 510  
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si  
spletna stran: www.jazmp.si

## 8. KAKO NAJ SHRANJUJEM OLAPARIB?

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.



## **BOLNIKOV DNEVNIK**

Med zdravljenjem z olaparibom priporočamo vodenje dnevnika, ki vam omogoča varno in zanesljivo jemanje zdravila ter zapisovanje neželenih učinkov.

Prosimo, prinesite svoj dnevnik na vse načrtovane obiske k svojemu zdravniku. Vaš zdravnik vam bo tako lažje pomagal pri morebitnih vprašanjih o zdravljenju ali obvladovanju neželenih učinkov zdravila.

## POMEMBNI PODATKI

Zdravstvena ustanova:

Zdravnik onkolog:

Telefonska številka:

1. Odmerek olapariba:

Datum:

2. Sprememba odmerka olapariba:

Datum:

3. Sprememba odmerka olapariba:

Datum:

4. Sprememba odmerka olapariba:

Datum:

5. Sprememba odmerka olapariba:

Datum:

6. Sprememba odmerka olapariba:

Datum:

7. Sprememba odmerka olapariba:

Datum:

# NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE BOLNIKOVEGA DNEVNIKA

1. CIKLUS
Datum pričetka ciklusa: 
Odmerek olapariba:

DAN CIKLUSA	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<b>ODMEREK</b>																												
Število tablet																												
<b>SIMPTOMI IN NEŽELENI UČINKI</b>																												
Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki: 1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.																												
<b>SLABOST</b>																												
<b>BRUHANJE</b>																												
<b>IZGUBA TEKA</b>																												
<b>DRISKA</b>																												
<b>UTRUJENOST</b>																												
<b>OSTALO:</b>																												
<b>BELEŽKE:</b>																												

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Vpišite število tablet zdravila, ki ste jih zaužili zjutraj in zvečer.








Če opazite neželene učinke, označite, kako hudi so: stopnja 1 pomeni blag neželen učinek, stopnja 5 pa zelo hud.

V beležke lahko vpišete:

- morebitne težave pri jemanju zdravila
- če opazite kateri koli neželeni učinek
- morebitne izpuščene odmerke in razloge zanj
- vaše občutke ob zdravljenju
- dodatna vprašanja, ki bi jih želeli postaviti svojemu zdravniku

# 1. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 2. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 3. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.



Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 4. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.








### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# 5. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 6. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 7. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.



Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 8. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 9. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 10. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 11. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.



Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 12. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 13. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:








13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# 14. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 15. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.



Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 16. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 17. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 18. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 19. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b>													
Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.



Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 20. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 21. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

### NEŽELENI UČINKI

1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 22. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Odmerek olapariba:








13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# 23. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.



Odmerek olapariba:

13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

**NEŽELENI UČINKI**  
1 pomeni blag neželen učinek, 5 pa zelo hud.


**BELEŽKE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 24. CIKLUS

Datum pričetka ciklusa:

DAN CIKLUSA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ODMEREK Število tablet													
													
<b>SIMPTOMI IN</b> Z 1 do 5 označite, kako hudi so neželeni učinki:													
SLABOST 													
BRUHANJE 													
IZGUBA TEKA 													
DRISKA 													
UTRUJENOST 													

**OSTALO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom.





A large, rounded rectangular writing area with a light pink border. The interior is white and contains 18 horizontal lines for writing, starting from the top margin and ending at the bottom margin.



A large, rounded rectangular area with a light pink border, containing 18 horizontal lines for writing.



A large rectangular writing area with a light pink border and rounded corners. The area is filled with horizontal lines, providing a space for writing.



